

Beitrag
zur Kasuistik der Concretio cordis
mit Berücksichtigung der Indika-
tionsstellung für die Cardiolyfis.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

medizinischen Doktorwürde

vorgelegt der

hohen medizinischen Fakultät



der Albert-Ludwigs-Universität

zu Freiburg im Breisgau

von

Georg Hagen

aus Berlin.



Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Freiburg i. Br.

Dekan:

Geh. Hofrat Prof. Dr. Kraske.

Referent:

Prof. Dr. de la Camp.

Beitrag
zur Kasuistik der Concretio cordis
mit Berücksichtigung der Indika-
tionsstellung für die Cardiolytis.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Während die operative Behandlung der Pericarditis in ihren Anfängen bis in die vergangenen Jahrhunderte zurückreicht, und die Punktion oder Incision des Herzbeutels schon lange Zeit als oft lebensrettende Eingriffe galten, sind die nicht seltenen Folgezustände der Pericarditis, die wir heute unter dem Namen der cardiothorakalen Synechien zusammenfassen, bis vor kurzem ein Leiden gewesen, an dem alles therapeutische Können scheiterte. Von Lancisi, der als erster gegenüber der älteren Annahme eines congenitalen Defects die entzündliche Natur der pericardialen Verwachsungen lehrte, zunächst nur zum Gegenstand der pathologisch-anatomischen Forschung erhoben, knüpft sich ein bahnbrechender Fortschritt an die Namen Skoda's und Friedreichs, deren exakten Beobachtungen die Klinik die Kenntnis der wichtigsten Punkte in der Symptomatologie des Leidens verdankt. Wie eifrig auch das Krankheitsbild ausgebaut wurde, so konnten doch die nach schwerem cardialen Siechtum fast ausnahmslos letal endigenden Zustände nur diagnostisches Interesse erheischen, einer wirksamen therapeutischen Beeinflussung waren sie nicht zugänglich. Es gehört zu den Errungenschaften des großen Aufschwunges der Chirurgie in den letzten Dezennien, daß Delorme und Beck in Newyork rieten, die Verwachsungen zu durchschneiden und so das Herz direkt aus seinen Banden zu befreien. Es ist jedoch nichts darüber veröffentlicht, ob sie diesen Vorschlag auch praktisch ausgeführt haben. Jedenfalls

wäre das Verfahren außerordentlich eingreifend, und es ist höchst wahrscheinlich, daß die durchschnittenen Stränge bald wieder miteinander verwachsen. Auch wurde vorgeschlagen, die Talma'sche Operation auszuführen. Doch ist sie durchaus unangebracht, da sie das Übel gar nicht an seiner Wurzel angreift, denn Leberstauung und Ascites haben ihre Ursachen in der Herzstörung, und mit Besserung derselben wird auch die viscerale Stauung nachlassen.

Radikaler, aber auch sinnreicher hat Brauer gedacht, als er im Jahre 1902 unter dem Namen Cardiolyse, „um das Herz von der ungeheueren Mehrarbeit zu entlasten“, eine Methode zur chirurgischen Behandlung der chronischen Mediastino-Pericarditis bekannt gab. Seine Vorschläge, die Petersen und Simon zuerst an mehreren Fällen zur Anwendung brachten, bestanden darin, man möge durch Sprengung des knöchernen Rippenringes das Herz funktionell entlasten. Dieses Ziel soll nicht erreicht werden durch die tief eingreifende Operation einer ausgedehnten Lösung der Verwachsungen selbst, sondern dadurch, daß man dem Herzen statt der knöchernen Decke eine weiche Bedeckung schaffe.

Im Laufe der verfloßenen Jahre sind 17 Fälle bekannt gegeben, die nach der vorgeschlagenen Methode behandelt worden sind. Diese Veröffentlichungen beweisen, daß das Verfahren Anklang gefunden hat und tatsächlich die guten Erfolge zeitigt, die Brauer in seinen Publikationen in Aussicht gestellt hat. Der Indikationsbereich ist seitdem dauernd erweitert worden. Treupel operierte eine in den ersten Anfängen begriffene Mediastino-Pericarditis. Bei drei Fällen, die v. Beck operierte, handelte es sich um Pleuroperi-

carditis. Die Erfolge auch dieser Grenzfälle sind so gute, daß ein englischer Autor (Bewley) die Indikation der Brauer'schen Cardiolyse auch ohne Mediastino-Pericarditis auf alle Fälle ausgedehnt wissen will, in denen das hypertrophisch erweiterte Herz durch nachweisbare Hebung des Brustkorbes ein bedeutendes Maß von Mehrarbeit zu liefern gezwungen ist.

Ich bin nun in der Lage, den bereits bekannten einen weiteren Fall hinzuzufügen, der in der Freiburger medizinischen Klinik seit drei Jahren beobachtet wird.

Fall I.

Concretio cordis mit Cardiolyse nach Brauer.

Johann K., 18jähriger Landwirt aus Kürzell bei Lahr.

Anamnese. Patient weiß von Kinderkrankheiten nichts anzugeben; Rachitis will er nicht gehabt haben.

Mit 6 Jahren erkrankte Patient an Lungenentzündung, über die wir des Nähern nur erfahren, daß sie sehr schwer war, und die Reconvalescenz sehr lange Zeit in Anspruch nahm. In der Folgezeit war Patient immer sehr schwächlich und mußte sich sehr schonen. Er litt häufig an Stechen in der linken Seite. Die linke Brusthälfte blieb im Vergleich zur rechten in der Entwicklung zurück und war etwas gekrumpft, so daß schließlich die rechte Schulter hoch stand und die Brustwirbeltäule nach rechts gekrümmt war. Zugleich entstand am unteren Ende des Brustbeins ein flaches Grübchen und vertiefte sich weiterhin. Als Ursache weiß der Patient über eine traumatische oder berufliche Schädigung ebenso wenig wie über anderweitiges Vorkommen in seiner Familie etwas anzugeben. Patient war immer zu Hause in der eigenen Landwirtschaft tätig. Insbesondere seit der Zeit seiner Schulentlassung

war er unfähig, schwerere Arbeit zu leisten, da er dabei rasch ermüdete und Herzklopfen und Atemnot bekam.

Bei der Musterung im Frühjahr 1908 wurde er wegen eines Herzleidens zurückgestellt.

Im Laufe des Sommers 1908 zeigten sich wiederholt Anschwellungen beider Füße in der Knöchelgegend, rechts bedeutend stärker als links. Der Appetit war gut. Außer den genannten haben keine Beschwerden bestanden.

Am 13. VII. 1908 läßt sich Patient in die Klinik aufnehmen, weil die Schwellung der Beine in der letzten Zeit erheblich zunahm und er dadurch arbeitsunfähig wurde.

Bei der Untersuchung wurde folgender Befund erhoben: Kräftiger, muskulöser Mann. Oedeme an beiden Unterschenkeln und den Füßen bis zu den Knien herauf; nach einigen Stunden Bettruhe auch an den inneren abhängigen Partien der Oberschenkel. Es können Dellen von 1-2 cm Tiefe eingedrückt werden. Leichte Rechts-Skoliose der Brustwirbelsäule. Geringer Grad von Trichterbrust. Auf der Haut des Abdomens ziemlich reichliche eingetrocknete und vereinzelt frische Miliaria crystallina.

Halsvenen besonders stark überfüllt, strangförmig hervortretend, pulsieren systolisch im doppelten Rhythmus als die Carotis.

Die Endphalangen der Finger sind nicht aufgetrieben. Die Lymphdrüsen zeigen nichts Bemerkenswerthes.

Die Sinnesorgane sind intakt. Im Bereich der Motilität und Sensibilität findet sich nichts abweichendes. Pupillen-, Sehnen- und Hautreflexe sind im normalen Maße vorhanden.

Bei tiefer ruhiger Atmung bleibt die linke Thoraxhälfte in ihrer ganzen Ausdehnung etwas hinter der rechten zurück. Die Zahl der Atemzüge entspricht der Norm.

Die Bestimmung der Lungengrenzen durch die Perkussion ergab folgendes: Die rechte Lungengrenze steht vorn am oberen Rand der 6. Rippe, hinten entspricht sie der 10. Rippe. Die linke hintere Lungengrenze reicht nach unten bis zum 11. Intercostalraum.

Die respiratorische Verschieblichkeit der unteren Lungengrenzen ist rechts vorn und hinten gut erhalten; links hinten dagegen kaum nachzuweisen.

Der Lungenklopfschall ist vorn über der rechten Lunge von normaler Beschaffenheit, vorn links in den Schlüsselbeingruben, besonders der unteren, verkürzt und höher mit tympanitischem Klang.

Rechts hinten oben und beiderseits hinten unten Schallverkürzung, besonders links und hier fast 3 Querfinger hoch.

Die Atmung über der Lunge ist im allgemeinen vesiculär; über dem gedämpften Bezirk rechts hoch oben hauchend, keine Rasselgeräusche.

Links hinten unten im Vergleich zur übrigen Lunge abgeschwächtes Atmen und vereinzeltes inspiratorisches feinblasiges Rasseln. Vorne nirgends Katarrh.

Husten und Auswurf bestehen zur Zeit nicht.

Bei der Inspektion des Thorax sieht man in der ganzen Herzgegend lebhafte Pulsationen. Unter diesen markiert sich der Spitzenstoß im 5. Intercostalraum etwas außerhalb der Mammillarlinie. Der Spitzenstoß ist hebend, beträchtlich verbreitert und bis 2 Querfinger außerhalb der Mammillarlinie fühlbar; zugleich nimmt man eine starke Erschütterung der 4. und 5.

Rippe wahr. Bei einer genauen Analyse des Spitzenstoßes, der bei der Inspektion deutlich als positives Phänomen imponiert, erweist sich derselbe alternierend mit dem Cartispuls und Radialispuls. Es besteht also ein positives, der Diafiole zugehörendes Phänomen. Synchron mit dem Druckanstieg in der Carotis werden die das Herz deckenden Partien der Brustwand einwärts gezogen. In der Diafiole darauf hat man das genaue Gefühl, wie die systolisch eingezogen gewesene Thoraxwand mit deutlich wahrnehmbarem Ruck in ihre frühere Lage zurückschnellt und dabei dem palpierenden Finger einen merklichen Stoß versetzt.

Herz. Die oberflächliche Herzgrenze fällt mit der tiefen in ganzer Ausdehnung zusammen. Eine Verschieblichkeit bei der Respiration oder bei Änderungen der Körperlage war nicht nachzuweisen.

Die obere Grenze beginnt am oberen Rande der 3. Rippe, verläuft dann in einem stark nach außen konvexen Bogen lateralwärts und überragt im 5. Intercostraraum die Mammillarlinie um 2 Querfingerbreite. Rechts entspricht die Grenze dem rechten Sternalrand. An der breitesten Stelle gemessen betrug der Abstand der linken Grenze von der Mitte des Sternums 14 cm.


Beim Auskultieren über der Herzspitze hört man den ersten Ton dumpf und etwas paukend. Der zweite Ton ist gespalten. Der nachschleppende Ton schließt sich eng an den zweiten an und ist durch keine besondere Betonung ausgezeichnet; derselbe ist an der Basis ebenfalls zu hören und trägt hier den Accent.

Über der Pulmonalis ist der zweite Ton stark betont.

Geräusche sind über keinem Ostium wahrzunehmen, ebenso nirgends pericarditisches Reiben.

Die Herzaktion selbst ist gleich wie der Puls beschleunigt, man zählte 96 Schläge in der Minute. Die Schlagfolge ist regelmäßig. Der Radialpuls war von leidlicher Füllung und Spannung. An der Radialis sind nicht alle Pulswellen gleich kräftig. Auf der Höhe der Einatmung wurde der Radialpuls deutlich kleiner als in der Atempause. Es handelte sich also um einen *Pulsus paradoxus*.

Um einen genaueren Einblick in dies besondere Verhalten des Pulses zu gewinnen, wurde derselbe mit dem Jacquet'schen Sphygmographen registriert.



(Fig. 1) Radialpuls (1908).

Die Atmung wurde leider nicht mitgeschrieben, sodaß es nicht mehr möglich ist, ihr Einwirken auf das Zustandekommen des *Pulsus paradoxus* präzise anzugeben. Soviel kann man jedoch erkennen, daß nicht auf die kleinste Pulswelle mit Beginn des Expiriums sofort die größte folgt; vielmehr ist der Verlauf gleichmäßig wellenförmig, indem progressiv die niederen Exkursionen in hohe und umgekehrt übergehen.

Das Abdomen ist aufgetrieben und meteoritisch auf Druck nirgends schmerzhaft und überall weich und leicht eindrückbar; nirgends Resistenzen. In den abhängigen Partien geringe Dämpfung, die bei Lagewechsel verschieblich ist. Fluktuation.

Der untere Leberrand liegt etwas oberhalb des Rippenbogens.

Die Milz ist anscheinend vergrößert, perkutorisch nicht deutlich abgrenzbar, nicht palpabel.

Mundhöhle ohne Besonderheiten. Zähne gut, keine Spuren von Rachitis.

Der Urin, welcher durchschnittlich 1500-2500 ccm beträgt, ist hellgelb, klar, reagiert sauer und hat ein spezifisches Gewicht von 1011. Eiweiß und Zucker wurden nie gefunden, Urobilin war zeitweise nachweisbar.

Auf Grund dieses Krankheitsbildes wurde die Diagnose gestellt: Synechia pericardii mit Kreislaufstörungen.

Der weitere Verlauf der Erkrankung gestaltete sich folgendermaßen: Unter Einhaltung strenger Bettruhe schwellen die unteren Extremitäten erheblich ab, sodaß nach 8 Tagen die Oedeme vollständig geschwunden waren. Ebenso bildete sich der Ascites gänzlich zurück. Dagegen stellte sich ein mäßiges pleuritiches Exsudat ein, das sich in größerer Mächtigkeit links etablierte. Beiderseits entsprach die Dämpfungsgrenze hinten im Sitzen dem 4.-5. Dornfortsatz. Zugleich verlagerte sich das Herz ein wenig nach rechts. Während links die Verschiebung nur 1 cm nach einwärts betrug, überragte nunmehr die rechte Grenze den rechten Sternalrand um 3 Querfinger. Sobald der Patient für kurze Zeit aufstand und umherging, stellten sich mit großer Schnelligkeit die Oedeme wieder her. Nachdem man täglich eine intravenöse Injektion von 0,0005 und dann von 0,0007 Strophantin gegeben hatte, wurde hiermit eine bedeutende Hebung der Herzkraft erzielt. Der Puls verlangsamte sich auf 88

bis 72 Schläge in der Minute. Selbst nach stundenlangem Aufsein traten nur minimale Oedeme auf, die im Liegen rasch vollständig verschwanden.

Das subjektive Befinden besserte sich beträchtlich. Patient „fühlte sich viel leichter“, sodaß er um seine Entlassung bat und auf seinen Wunsch am 26. VIII. 08 mit entsprechenden Verhaltensmaßregeln die Klinik verließ.

Patient war so gebessert, daß er etwa ein Jahr lang seinem Beruf vollkommen nachgehen konnte. Allmählich machten sich wieder Decompensationsercheinungen geltend, die nur vorübergehend nach ärztlicher Behandlung aussetzten. Seit Juli 1910 nahmen die Beschwerden derart zu, daß Patient wieder die Klinik aufsuchte.

Am 28. XI. 10. Neuaufnahme: Status:

Starke Unterernährung, besonders eingefallen im Gesicht. Starke Cyanose der Wangen und Lippen und der sichtbaren Schleimhäute. Erhebliche Fingercyanose. Grundton der Haut etwas gelblich. Außer einer stark gefüllten Vene in der linken Flanke keine Andeutung eines Kollateralkreislaufes. Mit Ausnahme eines geringen Oedems an der Tibia kein Hydrops anasarca. Hochgradige Dyspnoe und Orthopnoe. Die Atmung (30 pro Minute) erfolgt nach costalem Typus mit intensiver Beteiligung der Auxilarmuskeln, Nasenflügelatmen. Die Schultern sind hochgezogen; der Thorax, maximal inspiratorisch erweitert, mißt in der Höhe der Mammillen 94 cm, in der Höhe des Proc. ensiformis 100 cm Umfang. Enormer Hochstand des Zwergefells.

Lungengrenzen: Rechts hinten unten 8 Proc. spin., links hinten unten 9 Proc. spin, links vorn von

der 3. Rippe an bis unter die Axilla, nirgends verschieblich. Rechts vorn nicht bestimmbar; von der 4. Rippe an tympanitische Dämpfung. In der rechten Axilla Dämpfung, die sich im Sitzen aufhellt; Lungenlebergrenze in der vorderen Axillarlinie 5. Rippe. Tympanitischer Klopfschall. Diffuse Bronchitis, Kompressionsatmen. Inspiratorisch werden die seitlichen Partien des Rippenbogens heftig einwärts gezogen. Das untere Ende des Brustbeins bewegt sich gleichfalls nach innen zu. Der ganze Brustumfang verkleinerte sich über den unteren und mittleren Thoraxpartien bei der Atmung und nahm im Exspirium zu.

In der ganzen Herzgegend sieht man lebhaftere Aktion. Der Spitzenstoß ist im 5. Intercostalraum zu erkennen in einer Ausdehnung, die der Größe eines 5-Markstückes entspricht. An dieser Stelle fühlt man systolische Erschütterungen und nimmt gleichzeitig dabei ein deutliches systolisches Schwirren wahr. Über der Pulmonalis hat man den palpatorischen Eindruck eines klappenden zweiten Tones. Auch im 4. Intercostalraum parasternal bemerkt man mäßige Pulfation. Einziehungen waren am Tage der Aufnahme nicht zu sehen. Später stellte sich das Thoraxschleudern in dem früher beschriebenen Umfang wieder ein.

Die absolute Herzdämpfung war nach rechts scharf gegen den linken Sternalrand abgesetzt. Eine Abgrenzung nach links war nicht möglich, weil die Dämpfung kontinuierlich in die pleuritische überging.

Die relative Herzdämpfung begann oben am oberen Rand der 2. Rippe und setzte sich nach rechts auf das Sternum fort, über dessen unterem Abschnitt die Grenze in der Medianlinie verlief. Nach links


wurde die am weitesten lateralwärts gelegene, mit Sicherheit dem Herzen angehörende Dämpfung $2\frac{1}{2}$ Querfinger außerhalb der Mammillarlinie gefunden.

Beim Auskultieren hört man über der Herzspitze laute klappende reine Töne, ebenso über der Herzmitte. An der Basis sind die Töne laut und rauh; der zweite Pulmonalton ist gespalten; er ist besonders accentuiert und bedeutend stärker als der 2. Aortenton.

Pericardiales Reiben war nirgends zu hören.

Die Herzaktion war regelmäßig. Der Puls sehr klein, von geringer Füllung und Spannung, beschleunigt auf 100-108 Schläge in der Minute.


Die Pulswelle war zunächst so schwach, daß die Palpation keinen Einfluß der Respiration erkennen ließ. Erst nachdem therapeutisch die Herzkraft gehoben war, erwies die graphische Darstellung das Vorhandensein eines ausgesprochenen Pulsus paradoxus.



(Fig. 2) Zeitschreibung: $\frac{1}{5}$ Sek.
Venenpuls an der Jugularis (26. XI. 10).

Der Venenpuls zeigte folgende Eigentümlichkeiten; auf jeden Carotispuls entfallen 2 Venenkollektas, der

erste zwischen c und v Welle, der zweite zwischen v und a Welle. Die Senkung des letzteren ist beträchtlich tiefer und ganz enorm im Augenblick, wo die Vene inspiratorisch abschwilt.



(Fig. 3)

Zeitschreibung: $\frac{1}{5}$ Sek.

oben: Carotis.

unten: Cardiogramm.

(26. XI. 10).

Das Cardiogramm ist äußerst charakteristisch. Im systolischen, abflinkenden, Schenkel bildet sich der „Herzstoß“ des in Kontraktion übergehenden Herzens als kleine Zacke scharf ab, die ein kleines Zeitteilchen dem Anstieg in der Carotiskurve vorausgeht. In der Diastole, synchron mit dem Eintreffen der Rückstoßlevation in der Carotis, sieht man deutlich, wie der Schreibhebel von der diastolisch vorgeschleuderten Brustwand emporgeschnellt wird, anscheinend über die Mittellage hinauschießt und gleich darauf elastisch in die Ruhestellung zurückfedert. Ferner ist hier noch eine bemerkenswerte Abhängigkeit von der Respiration zu erwähnen. Alle in die Höhe der Einatmung fallenden Erhebungen der Spitzenkurve zeigen sich in allen Dimensionen vermin-

dert. Sowohl die systolische Einsenkung ist flacher, als auch das Schleudern weniger ausgiebig.

Abdomen meteoristisch aufgetrieben, hochgradiger Ascites mit Spiegel 3 Querfinger über Nabelhöhe, Umfang 96 cm. In der Lebergegend tympanitischer Schall, Leber vermutlich in Kantenstellung. Später, nach Rückgang des Ascites, war die Leber stark vergrößert, grobhöckerig und auf Druck sehr schmerzhaft. Milz erheblich vergrößert.

Die tägliche Harnmenge betrug 1000-1500 ccm, klar, sauer, 1.0/100 Eiweiß, Sediment nicht aufzufinden.

Die Röntgendurchleuchtung des Thorax ergab folgenden Befund: Die Lungenfelder sind beiderseits diffus getrübt. Das Zwerchfell steht beiderseits hoch. Die Begrenzungslinie des Zwerchfells verläuft von der Seite nach der Mitte zu in ganz flachem Bogen. Die Atemexkursionen sind ganz gering. Am Herzschatten fällt auf, daß die linke Begrenzung anstelle der einzelnen Bogenlinien eine vom Aortenbogen schräg nach unten bis zum Zwerchfell verlaufende gerade Linie darstellt. Der Herzschatten ist nach links stark verbreitert und erscheint infolge der beschriebenen Begrenzung nach unten spitz ausgezogen. Der Herzschatten bildet links, da wo er auf dem Zwerchfell auftrifft, mit diesem einen stumpfen Winkel. Die Herzpulsation ist in den basalen Teilen deutlicher sichtbar als an der Spitze, die kaum eine pulsatorische Exkursion zeigt. Bei Atembewegungen ist der mediane Teil des Zwerchfells auch auffallend wenig beweglich.

25. XI. 10. Therapie: Bei absoluter Bettruhe erhielt Patient gegen die Dyspnoe Morphium; zur Unterstützung der Diurese p. d. 6,0 Diuretin, später 0,5 bis 1,0 Theocin.

27. XI. 10. Durch diese Behandlungsweise gelang es, eine beträchtliche Zunahme der Harnmenge auf 2000-2500 ccm täglich zu erzielen; dementsprechend Verkleinerung des Ascites, so daß nach 14 Tagen der Leibesumfang nur noch 92,0 cm betrug. Gleichzeitig war auch eine Abnahme des Körpergewichtes von 65,0 auf 62,8 K zu verzeichnen, die wohl allein der Resorption des Höhlenhydrops zur Last zu legen ist, da im selben Zeitraum der allgemeine Ernährungs- zustand nicht unwesentlich gehoben werden konnte.

Der Puls kräftigte sich und war langsamer, die Frequenz sank auf 80-72. Die Dyspnoe war weniger angestrengt, die Zahl der Atemzüge betrug 20-16.

Diesem objektiv günstigeren Befund ging auch Besserung des Allgemeinbefindens parallel.

Nach Aussetzen der Medikation resultiert ein zeitlich genau koinzidierender Umschlag ad pejus. Der Ascites wuchs rapid wieder an, die Diurese sank, die Atemnot war hochgradig, wie je zuvor. Das subjektive Befinden verschlechterte sich zusehends.

13. XII. 10. Patient wird zur Ausführung der Kardiolyse auf die chirurgische Klinik verlegt.

Unterzieht man die Krankengeschichte einer kritischen Sichtung, so darf anamnestisch als feststehend angesehen werden, daß der Patient als Kind an einer akuten fieberhaften Lungenerkrankung litt, sei es eine croupöse Pneumonie oder Bronchopneumonie, die sehr schwer auftrat und nach wochenlangem Bestehen schließlich einer nur relativen Genesung Platz machte. Anschließend hatte Patient in den Adoleszentenjahren mannigfache Beschwerden, die in Herzklopfen, Stechen in der linken Seite und Atemnot bestanden und ihn

weniger leistungstüchtig als seine Altersgenossen machten. Dabei fiel dem Patienten selbst auf, daß die linke Brusthälfte allseitig verkleinert war und der linke Schultergürtel tiefer stand; die Brustwirbelfäule war skoliotisch nach rechts ausgebogen.

Die klinische Untersuchung wies 1908 im linken Brustraum pleuritische Schwarten nach, durch deren Retraktion die Herzfigur in toto nach links verzogen war. Nach einem Recidio der Pleuritis konnte eine Zunahme der Verlagerung nach links konstatiert werden. Der lokale Befund am Herzen zeigte eine vergrößerte Herzdämpfung, welche die für pericardiale Ergüsse bekannte pyramidenförmige Gestalt nachahmte, absolute und relative Grenzen waren im wesentlichen identisch.

Bei der Frage nach der Genese dieser Vergrößerung des Gesamtherzens konnte ein Klappenfehler auf Grund des Fehlens entsprechender Auskultationserscheinungen ohne weiteres eliminiert werden. Ebenso war ein noch bestehendes pericardiales Exsudat aus der Lebhaftigkeit der Herzaktion in allen Bezirken der Dämpfung auszuschließen. Vielmehr war das Krankheitsbild in besonderer Berücksichtigung der später genauer zu besprechenden typischen Zirkulationsstörungen aufzufassen als das Produkt einer schleichend verlaufenden Pericarditis, ein Leiden, das wir als *Concretio cordis* bezeichnen und welches hier kombiniert war mit chronisch retrahierender Pleuritis.

Bei der Ergründung der Aetiologie des Leidens konnten wir bis zum Eintritt in die Klinik von einer weiteren akut intercurrenten Erkrankung nichts erfahren; insonderheit für eine Affektion tuberkulöser Art fehlt jeder Anhaltspunkt. Der einzige aetiologische Anhaltspunkt ist die dunkle Erinnerung an jenen 12 Jahre

zurückliegenden pneumonischen Infekt. Wir dürfen nicht fehl gehen, wenn wir mit dieser Pneumonie die jetzige Pleuropericarditis in Verbindung bringen. Eine Bestätigung dieser Annahme erblicken wir in der Feststellung Weichselbaums, daß das pneumonische Virus, wie es für die post-pneumonische Pleuritis schon längst bekannt war, auch im Herzbeutel oft nachzuweisen ist, ohne daß klinische Erscheinungen bestehen, und zwar sei fibrinöse Pericarditis, die ja gerade zu Verwachsungen prädisponiert, wenigstens in geringerem Grade sehr viel häufiger vorhanden, als man gewöhnlich anzunehmen pflege. Ein amerikanischer Autor, Riesmann, möchte in der Mitbeteiligung des Pericards eine häufige Ursache der „verzögerten Resorption“ bei Pneumonien sehen. Auch Umber scheint diese Erwägung der Aufmerksamkeit wert.

Es fragt sich nun, ob wir wirklich die Affektion des Pericards soweit zurückdatieren dürfen, während doch in der ganzen Zeit kein direktes Symptom auf diesen Prozeß hindeutete. Gehen wir von der Erfahrung aus, welche fast alle Autoren, die sich mit diesem Gegenstand befaßt haben, ich nenne nur Riegel, v. Schrötter, Rosenbach, Brauer, Oestreich-de la Camp, übereinstimmend äußern, so kann es als erwiesen gelten, daß reine unkomplizierte, wenn auch totale Obliterationen des Herzbeutels ohne jede Spur von Erscheinungen im Leben verlaufen können. Das beweist, daß die in anderen Fällen im Leben beobachteten Störungen nicht der Verwachsung selbst, sondern gewissen Komplikationen zugehören müssen. Als solche Komplikationen werden gewöhnlich angesehen:

Erstens Ernährungsstörungen im Myocard als Folge der Schrumpfung des pericardialen Narbengewebes.

Zweitens Mediastino-Pericarditis und Pericarditis externa, die zu mehr oder weniger starken Verwachsungen zwischen Pericard, Pleura, Zwerchfell, großen Gefäßen und knöcherner Brustwand führen.

Daraus können wir die Berechtigung ableiten, nachdem die Krankheit als chronisch retrahierende Pleuropericarditis fast latent verlaufen war, das Inerscheintreten der vorhandenen Symptome als durch diese beiden Komponenten, die myocardiale und mediastinale, bedingt anzusehen.

Neben diesen beiden Faktoren ist in unserem Falle noch ein weiteres, die systolische Funktion des Herzens hemmendes Moment in Betracht zu ziehen und zwar der Zustand der benachbarten Lungenränder. Bekanntermaßen trägt in normalen Verhältnissen die elastische Spannung der Lungen dazu bei, die Wände des Herzens in der Diastole auszudehnen; das Herz öffnet sich unter Mithilfe des negativen Thoraxdruckes. Holzkecht und Hofbauer konnten röntgenoskopisch „eine nicht unbeträchtliche Größenzunahme des Herzschattens“ während starker Inspiration wahrnehmen. Es ist durchaus begreiflich, daß starre Bindegewesmassen, welche den direkten Kontakt der Lungen mit dem Herzen ausschalten, auch den kreislauffördernden Einfluß der Atmung herabzusetzen imstande ist. Besonders wichtig scheint der Sinus pleuræ mediastino-costalis zu sein, nach dessen bei unserem Fall stattgehabter Obliteration das atmende Lungengewebe durch präcardiale Schwarten vom Herzen weit abgedrängt ist. Auf die Bedeutung dieses Zustandes hat in jüngster Zeit erst de la Camp aufmerksam gemacht, indem er ausführte, „daß lokale Ausschaltung der Lungenelastizität als Gegenkraft gegen den federnden Thorax und teilweise Über

nahme dieser Kraftaufgabe durch das Herz diesem gewaltige Belastung schafft."

Die aus allen diesen Momenten resultierende Alteration der Herztätigkeit äußert sich in typischen Symptomen, die hier der Reihe nach besprochen werden sollen.

1. Systolische Einziehung der Regio cordis und diastolisches Thoraxschleudern.

2. Diastolischer Venenkollaps.

3. Pulsus paradoxus.

4. Stauungsercheinungen.

5. Abnormer Atemmechanismus.

1. Systolische Einziehung der Regio cordis und diastolisches Thoraxschleudern. Ein negativer Ictus cordis an sich braucht keinerlei Bedeutung zu haben. Mackenzie hat ausführlich nachgewiesen, daß eine systolische Einziehung auch in allen Fällen vorhanden ist, wo die Vorderfläche des Herzens vom rechten Ventrikel gebildet wird. Hiervon unterscheidet sich jedoch recht wesentlich das klassische Symptom, dessen Feststellung sich besonders an die Namen Friedreich und Kußmaul knüpft. Entsprechend der Forderung dieser Autoren fanden wir eine breite systolische Einziehung der Brustwanddecke des Herzens und zwar nicht nur der Intercosträume, sondern auch der 4. und 5. Rippe. Diese systolisch eingezogenen Partien federn alsdann vermöge ihrer Elastizität mit einem deutlich fühlbaren Ruck in ihre alte Lage zurück. Bedingung für dieses Thoraxschleudern, dessen Wichtigkeit namentlich Brauer betont, ist nach Friedreich, daß das Herz an seine Hinterwand, insbesondere am Diaphragma befestigt ist und so eine Vorwärtsbewegung bei der Systole, wie es normaler Weise ge-

schehen sollte, verhindert wird. Außerdem muß noch bei den Pericarditiden der vordere Komplementärraum obliteriert sein, so daß es der Lunge unmöglich ist, ihn auszufüllen.

Durch die Cardiographie waren wir in der Lage, Aufschluß über die Größe der wirksamen Kraft zu erhalten. Im Jahre 1908 gewannen wir eine Kurve, welche sich in nichts von den durch Mackenzie als Kardiogramm des rechten Herzens mitgeteilten unterschied: Der Abfall der Kurve ist bedingt durch die Entleerung des Ventrikels, der Anstieg schreitet während der Wiederfüllung in der Diastole langsam vor.

Demgegenüber wurde 1910 eine ganz evidente Änderung beobachtet: hier markierte sich die Diastole als ein steiler, d. h. in Anbetracht der großen Geschwindigkeit des Sphygmographen, als ein momentaner Anstieg, der an Mächtigkeit die systolische Einziehung bei weitem übertraf. Dieses charakteristische Verhalten wurde von Brauer als Äußerung einer aktiven Diastole aufgefaßt und findet sich in ganz analoger Weise in den diesbezüglichen von Brauer mitgeteilten Kardiogrammen.

Dieses Vorschleudern war zeitweise von einem besonderen Herzton begleitet. Wie Herr Prof. Roos, der damals beim Patienten mit der von ihm ausgehauenen Marbe'schen Rußmethode Aufnahmen machte, mir mündlich mitzuteilen die Liebenswürdigkeit hatte (wofür es mir an dieser Stelle gestattet sei, bestens zu danken) und auch in seinen unlängst erschienenen „Untersuchungen über die Schallererscheinungen des Herzens“ ausführt, handelte es sich um einen Galopprrhythmus des protodiastolischen Typus. Nach Roos weisen die Schallererscheinungen, die nach dem zweiten Ton er-

zeugt werden, alle Charakteristika auf, wie sie bisher nur bei „Kammertönen“, bei Anspannung der Kammern beobachtet werden konnten. Auf Grund der Tonbeschreibung kommt Roos zu der Auffassung, daß es sich bei dieser Art des Galopprrhythmus um einen in Beginn der Diastole sich abspielenden Vorgang handelt. Dies könnte nur die Füllung im Beginn der Diastole sein, die normalerweise ohne alle nachweisbaren Stöße vor sich geht. Man kann sich in Anlehnung an neuere Anschauungen, die auch für die physiologischen Verhältnisse eine ähnliche Erklärung heranziehen, wohl vorstellen, daß bei einem Herzen, wo die normalerweise die Diastole des Organs unterstützenden Faktoren fehlen, vielleicht aktive kompensatorische Vorgänge die diastolische Erweiterung der Kammern bewirken helfen. Da jedoch zur Stütze einer solchen Auffassung bisher noch genauere Anhaltspunkte fehlen, hat die auch von Roos vertretene Ansicht viel Wahrscheinlichkeit für sich, daß bei der Mediastina=Perikarditis die Diastole im Beginn rein passiv beschleunigt durch die am Herzen infolge der Verwachsungen wirkenden elastischen Kräfte vor sich geht.

Es waren also im ganzen, ähnlich wie in einem Brauer'schen Falle, 4 Töne während einer Herzrevolution vorhanden: der erste Ton, ein gespaltener zweiter Ton und endlich den an diesen sich anschließenden „Thoraxschleuderton“.

Voraussetzung für diese systolische Retraktion ist, wie schon Friedreich bemerkte, eine hinreichend kraftvolle Aktion des Herzens. Wir beobachteten, wie 1910, als es dem Patienten sehr schlecht ging, die Einzelschläge schwanden und erst wieder eintraten, als die Herztätigkeit sich besserte.

2. Diastolischer Venenkollaps.

Im innigsten Zusammenhang mit der systolischen Retraktion und dem Thoraxschleudern steht „der rasche diastolische Kollaps der Halsvenen“, neben den beiden erstgenannten Phänomenen das III. Kardinalsymptom Friedreich's. Friedreich selbst erklärt dadurch den Kollaps, daß die Rippen, nachdem sie durch die Kammerystole einwärts gezogen waren, zurückschnellen, wodurch die Brusthöhle sich plötzlich erweitert und den Abfluß aus den überfüllten Venen beschleunigt. Diese Deutung ist neuerdings angefochten worden. Mackenzie sieht in diesem Symptom lediglich den Ausdruck einer überwiegenden Größenzunahme des rechten Herzens im Vergleich zum linken. Jedenfalls verdient es Beachtung, daß genau dieselbe Form des diastolischen Venenkollapses auch bei Tricuspidalinsuffizienz beobachtet wird.

3. Pulsus paradoxus.

Das inspiratorische Kleinerwerden oder fast völlige Verschwinden des Radialpulses hat in der Literatur eine höchst wechselnde Beurteilung erfahren. Nach Griesinger's und namentlich Kußmaul's grundlegenden Beobachtungen sollte der Pulsus paradoxus, wie ihn Kußmaul benannte, ein sicheres Zeichen der schwierigen Mediastino-Pericarditis sein.

Durch eine große Zahl von Autoren ist seitdem erwiesen, daß diese Pulsform durchaus nicht pathognomonisch für das in Frage stehende Leiden ist. Es wurde sogar die Meinung vertreten, daß es gar keine pathologische, sondern eine normale Erscheinung sei. Immerhin ist diese Pulsform ein Streitpunkt geblieben; so wenig sicher ist man bei der Werthschätzung dieses Phänomens, daß Kröhl noch in jüngster Zeit sagen

konnte, die Ursachen des Pulsus paradoxus kenne man noch nicht sicher genug, um diagnostische Schlüsse daraus ziehen zu können. Zur Klärung dieser widersprechenden Ansichten hat in letzter Zeit Wenckebach beigetragen durch die Feststellung, daß es objektive Merkmale gibt, um mit Sicherheit aus dem Verhalten der Pulskurven auf die Ursache des Pulsus paradoxus schließen zu können. Wenckebach gibt als charakteristisch für den mechanisch bedingten Pulsus paradoxus an: Die Pulswellen nehmen bei Inspiration ab, bei Expiration zu und während der Atempausen findet man die größten Pulswellen.

Nehmen wir daraufhin unsere Pulskurve zur Hand, so ist unschwer zu erkennen, daß sie zur Gruppe des mechanisch verursachten Pulsus paradoxus eingeordnet werden muß. Wenn es auch denkbar wäre, daß es noch andere mechanische Verhältnisse gäbe, unter denen der Pulsus paradoxus auftritt, so werden wir doch in diesem Fall, wo die große Reihe der anderen Symptome auf dasselbe Leiden hinweisen, in seinem Vorhandensein eine wesentliche Stütze der Diagnose erblicken.

Interessant ist der Befund, welchen ich nirgends in der einschlägigen Literatur erwähnt fand, daß zur Zeit, wo wie oben angenommen, wegen Nachlassens der Herzkraft die systolischen Einziehungen fehlten, auch der Pulsus paradoxus nicht nachzuweisen war.

4. Stauungserrscheinungen.

Da die Adhäsionen den muskelschwachen rechten Ventrikel sehr viel mehr sowohl in seiner Systole als Diastole beeinträchtigen, so finden wir auch gerade in Gestalt von Zirkulationsstörungen im venösen Kreislauf Symptome, die für eine solche vorwiegende Beteiligung des rechten Herzens sprechen. Die Zirkula-

tionsstörungen äußerten sich in der Peripherie als Cyanose, Überfüllung der sichtbaren Venen und als Hydrops anasarca der unteren Körperhälfte, der jedoch später vollkommen verschwand. Die passive Kongestion der visceralen Organe nahm zuletzt eine prädominierende Stellung ein; neben zeitweiser Stauungsbronchitis und Stauungsniere namentlich Vergrößerung und Induration der Leber mit angedeutetem Ikterus und hochgradigem Ascites, nicht allzustark geschwellte Milz.

Ein solcher Komplex von Abdominalsymptomen, besonders beim Fehlen des universellen Hydrops wird gewöhnlich als Cirrhose mixte bezeichnet, bei der das klinische Bild einer Mischform hypertrophischer und atrophischer Lebercirrhose vorliegt. Dasselbe Syndron, ausgehend von Pericardobliteration, hat Pick mit dem Namen der pericarditischen Pseudolebercirrhose bezeichnet und sieht als Ursache chronische Zirkulationsstörungen in der Pfortader an. O. Heß, der die Pick'sche Deutung der Genese dieser Symptome anfocht, glaubt dies Krankheitsbild zurückführen zu müssen auf das Zusammenwirken chronisch entzündliche Prozesse in den serösen Höhlen des Körpers, in welche eine chronische Pericarditis allerdings meist mit eingeschlossen ist. Es würde zu weit führen hier zu entscheiden, inwiefern unser Fall dieser „Polyserofitis“ ursächlich verwandt ist. Wir beschränken uns auf die von Heß selbst gegebene plausible Erklärung der unverhältnismäßigen Leberschwellung hinzuweisen: durch schrumpfendes pericardiales Gewebe nämlich werde oberhalb des Zwerchfelles eine Verengerung der Vena cava inferior verursacht. Diese Verengerung hatte, wie ihm Experimente mit Kakaobutter lehrten, ein Regurgitieren von Blut.

aus der Cava in die Lebervenen zur Folge. Es wäre denkbar, daß die von uns beobachtete Verziehung des Herzens nach links durch Abknickung der Vena cava inferior im selben Sinne unterstützend wirkte.

5. Abnormer Atemmechanismus.

Während dieses Symptom von den meisten Autoren bis jetzt keine Beachtung gefunden hat, konnte Wenckebach in allen ihn zu Gesicht gekommenen Fällen von adhäsiver Pericarditis eine inspiratorische Fixation bezw. Einwärtsbewegung des unteren Sternumendes sehen. Wenckebach legt die diagnostische Bedeutung dieses Symptomes in folgendem Satze fest: Bei Anwesenheit dieser Störung ist adhäsive Pericarditis höchst wahrscheinlich vorhanden, bei geräumiger inspiratorischer Vorwärtsbewegung der vorderen Brustwand ist diese Krankheit auszuschließen.

Vergegenwärtigt man sich den normalen Atemmechanismus wie ihn Östreich-de la Camp darstellen, so vollführen die Rippen bei der Einatmung eine Bewegung nach außen und oben. Art und Umfang ist für jede Rippe eine besondere. Denkt man sich durch gleichnamige Rippenpunkte horizontale Ebenen gelegt, so findet bei der ruhigen Einatmung eine nach unten (caudalwärts) zunehmende Vergrößerung der einzelnen Segmente statt, und zwar in querer wie in dorso-ventraler Richtung. Die Bewegung des Brustbeins fällt nach unten (caudalwärts) in wachsender Differenz geringer aus als die Bewegung der vorderen Rippenenden. An sich nimmt die Bewegungsgröße der einzelnen Brustbeinteile auch caudalwärts zu.

Die Störungen, welche die Atemtätigkeit durch die cardiothorakalen Synechien erfuhr, werden am besten durch die nachfolgende Tabelle erläutert:

1.	2. In Höhe d.	3. sterno-vertebraler Durchmesser			4. Brustumfang		
		a.	b.	c.	a.	b.	c.
		Pause	Insp.	Differz.	Pause	Insp.	Differz.
1.	Manubrium sterni	17,0	17 $\frac{3}{4}$	+ $\frac{3}{4}$	—	—	—
2.	2. Rippe	21,8	22,5	+ 0,7	94	94,5	+ 0,5
3.	Mammilla	25,2	25,0	- 0,2	97	97	0
4.	unteren Sternalrand	26,5	26,0	- 0,5	- 99	98,5	- 0,5

Diese Zahlen beweisen in der Tat, daß man den Eindruck eines paradoxen Atemmechanismus haben konnte. Der inspiratorische Stand schien der expiratorische zu sein und umgekehrt.

Es ist zu erwägen, ob die in der Anamnese erwähnte geringgradige Trichterbrust nicht vielmehr als Ergebnis häufig erfolgter derartiger Einziehungen zur Zeit wo der kindliche Brustkorb noch plastisch war, anzusehen ist und somit einer Harrison'schen Furche entspräche.

Ob der abnorme Atemmechanismus als ein so allgemein verwertbares Symptom der Concretio cordis, wie Wenckebach meint und wie wir für unseren speziellen Fall bestätigen konnten, wirklich zu beurteilen ist, muß noch weiteren Beobachtungen vorbehalten bleiben.

Bei einem Krankheitsbild, wie es eben geschildert wurde, werden wir die Diagnose Herzbeutelverwachsung mit großer Wahrscheinlichkeit stellen können; sicher aber wird aber die Diagnose erst durch den lokalen Befund am Herzen. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Erkennung desselben bietet neuerdings auch die Rönt-

genphotographie. Stuertz, Lehmann und Schmoll sind ziemlich übereinstimmend zu folgenden Ergebnissen gekommen, die sie als charakteristisch für Pericarditis adhæsiva ansehen:

1. Ein oder beide Herzzwerchfellwinkel sind mit bandartigen Strängen ausgefüllt.

2. Die Herzschattenconturen zeigen deutliche Zackenbildung.

3. Es besteht eine gleichsam verwischte, undeutlich flatternde Herzpulsation, entsprechend Überdeckung der Herzwände durch breite Adhäsionen.

4. Das Zwerchfell zeigt verringerte Bewegung als Ausdruck basaler Fixation, wenn als deren Ursache sonstige Erkrankungen der betreffenden Lungenseite ausgeschlossen werden können.

Bei unserem Fall konnten wir im großen und ganzen einen ähnlichen Röntgenbefund erheben: Die Herzschattenconturen gehen beiderseits mit einem stumpfen Winkel, der links besonders flach ist, in's Zwerchfell über; dessen medianer Abschnitt ist fast unbeweglich. Die Begrenzungslinie des Herzschattens ist nieveliirt, die charakteristischen Bogenlinien nicht erkennbar. An der Spitze sind pulsatorische Exkursionen nicht erkennbar.

Das Fehlen von Zacken, welche dem Herzschatten aufsitzen, spricht nicht gegen Pericarditis adhæsiva, da solche Bildungen von der Lokalisation des Prozesses der Mediaßina=pericarditis externa abhängen, der schließlich in mannigfaltigster Form auftreten kann.

Therapie. Was in therapeutischer Hinsicht zu tun sei, war einfach und leicht zu entscheiden. Es wurde der Versuch unternommen, durch Bettruhe und gleichzeitige Darreichung von Diureticis eine Kompensation

herbeizuführen. Das gelang zunächst auch. Die systolischen Einziehungen, die zeitweise weniger lebhaft gewesen waren, gewannen an Intensität. Die Oedeme waren in 14 Tagen vollständig, der Ascites bis auf Reste verschwunden. Der Puls war regelmäßig mit fast normaler Frequenz und gut gefüllt und gespannt. Vergrößerung der Leber und Milz bestand noch.

Sobald der Patient indessen das Bett verließ und umherging, oder nachdem die Medikation ausgesetzt wurde, stellte sich allemal mit auffallender Schnelligkeit die Decompensation wieder her.

Hieraus konnte der Schluß gezogen werden, daß die üblichen internen Heilmethoden nicht imstande waren, den Kranken wieder dauernd leistungsfähig zu machen.

Es ist ja ohne weiteres klar, daß es ein Herz auf's äußerste anstrengen muß, wenn es gezwungen ist, bei jeder Systole die Brustwand mitzunehmen, um sie in der Diastole wieder vorfedern zu lassen. Die stete Mitbewegung der knöchernen elastischen Thoraxwand muß auf die Dauer das Herz zum Erlahmen bringen.

Diese Erkenntniß drängt von selbst zur Frage, ob nicht durch andere Maßnahmen das über seine Leistungsfähigkeit in Anspruch genommene Herz entlastet werden kann. Diese können nur darin bestehen, daß die Mehrarbeit, die das Herz durch die Verwachsungen mit der Brustwand leisten muß, ausgeschaltet wird.

Diese Erwägung hat Brauer dazu veranlaßt, bei Fällen von Pericarditis, wo Verwachsungen zwischen der vorderen Herzwand und Brustwand bestanden, den Vorschlag zu machen, durch Entfernung der knöchernen Partien, speziell der Rippen, aus der Herzdecke das Herz funktionell zu entlasten.

Nach Umber ist der chirurgische Eingriff nur dann auszuführen, wenn man die Gewißheit hat, daß ein einigermaßen leistungsfähiger Herzmuskel da ist. Für die Arbeitsfähigkeit des Herzens erblickte Brauer einen Indikator in der Stärke und Breite der systolischen Thoraxeinziehung. Umber empfiehlt, durch möglichste Ausschaltung aller Herzarbeit, in absoluter Ruhelage, eventuell auch unter cardiotonischer und diuretischer Nachhilfe klarzustellen, wie weit die Herzleistung zu steigern ist. Wird auch damit nichts gewonnen, so darf man annehmen, daß auch die Cardiolyse zu spät kommt. Dieselbe ist natürlich gegenüber einer bereits ausgesprochenen Pseudocirrhosis hepatis machtlos, ohne daß die letztere eine Contraindikation gegen den Eingriff darstelle.

Es war also durch die Beobachtung unseres Patienten der Beweis erbracht, daß die Bedingungen erfüllt waren, von denen die Autoren die Ausführung der Cardiolyse abhängig machen.

Operation am 15. XII. 10. (Geh. Hofrat Prof. Dr. Kraske). Beginn mit Chloroformnarkose. Da wiederholt asphyktische Zustände eintraten, Übergang zu Ätherfauerstoffnarkose mit Sauerbruch'schem Überdruckapparat.

Es wird ein aus Haut und Muskeln bestehender hufeisenförmiger Lappen gebildet, dessen Basis in der linken vorderen Axillarlinie von der 2.-5. Rippe liegt und dessen Spitze bis an den linken Sternalrand reicht. Subperiostale Resektion der linken 2.-4. Rippe samt Knorpelanatz in Stücken bis 6 cm Länge. Sorgfältige Entfernung des Periosts. Blutstillung und Naht.

Kurz nach der Operation als Patient bereits im Bett lag, trat wieder ein schwerer Kollaps mit Puls=

losigkeit ein. Erst durch 1 mg Strophantin, intravenös gegeben, wurde eine anhaltende Hebung der Herzkraft erzielt, worauf mit 4 Ampullen Digipurat subkutan fortgefahren wurde.

Abends starke Nachblutung, so daß der Hautmuskellappen wieder aufgeklappt und Tamponade gemacht werden mußte.

Auf die technische Seite der Operation muß kurz eingegangen werden, da über ganz ähnliche Schwierigkeiten bei der Operation auch andere Autoren berichteten. Man muß sich vergegenwärtigen, daß bei dem sehr heruntergekommenen Patienten die an sich so gefahrlose Cardiolyse einen schweren Eingriff bedeutete. Das äußerst labile Herz, das fortwährend bedrohliche Narkosezufälle hervorrief, zwang dazu, die Operation so rasch als möglich zu vollenden. Trotz der erheblichen Schwierigkeiten, die mit der Ablösung der Periofts verbunden waren, war man bemüht, so sorgfältig als möglich dasselbe zu entfernen, da nach den Erfahrungen Umber's, Danielsen's u. a. schon ganz geringe Periofstreste zur Neubildung von Knochen-
spangen führen können und so das Resultat der Operation in Frage stellen. Aus Sorge, daß man an einer Stelle dünnerer Auflagerungen einmal in die Pleura geraten könnte, und wegen der großen Gefahr, welche von Seiten eines dadurch gesetzten Pneumothorax für die Zirkulation des schon vorher geschwächten Organismus erwächst, verzichtete man auf die meist ausgeführte Refektion bis in die vordere Axillarlinie und beschränkte sich darauf, die Rippen nur insoweit als sie das Herz deckten, wegzunehmen.

Nach Freilegung des Herzbeutels kamen mächtige Schwarten zu Tage von mindestens $\frac{3}{4}$ bis 1 cm Dicke,

welche die Ventrikel an die Brustwand hefteten. Dieselben setzten sich auf die benachbarte linke Pleura costalis und diaphragmatica fort. Soweit die Basis cordis überblickt werden konnte, bestand hier schwartige Obliteration der Pericardhöhle ohne Adhäsion der großen Gefäße an das Sternum. Im Gebiet des freigelegten Fensters entsprach dem Puls eine systolische Einziehung, in der Diastole wurde das Herz durch die Lücke vorgewölbt. Eine typische Aktion der Herzspitze wurde nicht beobachtet, sodaß dieselbe wahrscheinlich vom rechten Ventrikel gebildet wurde.

Die autoptische Befichtigung während der Operation bestätigte somit die in der Diagnose supponierten Veränderungen am Herzbeutel.

18. II. 11. Patient, der sich von der Operation gut erholt hat, wird auf Wunsch in seine Heimat entlassen. Die Wunde ist fast vollkommen zugeheilt. Ascites gerade noch nachweisbar. Besonders auffällig war das Freiwerden der Respiration. Keine Atemnot beim Gehen. Keine Oedeme, keine Cyanose. Herztätigkeit regelmäßig. Puls nicht wesentlich beschleunigt, gut gefüllt.

7. III. 11. Patient stellt sich zur Nachuntersuchung vor (in der med. Klinik). In der Zwischenzeit hat sich das Befinden dauernd gebessert. Patient fühlt sich bedeutend wohler, als vor der Operation. Der Ernährungszustand hat sich gehoben. Herzklopfen und Oedeme fehlten. Patient war tagsüber außer Bett und konnte leichtere Arbeit verrichten. Stärkere körperliche Tätigkeit verursachen ihm Atembeschwerden. Die Schwellung des Leibes habe freilich langsam wieder zugenommen.

Status (wird erhoben, nachdem der Patient die

Anstrengung einer mehrstündigen Reise, zum Teil über Land, hinter sich hatte). Leichte Cyanose im Gesicht, Hautfarbe subikterisch. Keine Oedeme. Halsvenen schwach gefüllt, Pulsation kaum sichtbar. Keinen Kollateralkreislauf andeutenden Venen sichtbar.

Thorax ausgesprochen faßförmig, maximal inspiratorisch erweitert, sehr großer Sternalwinkel. Hals kurz, Hochstand der rechten Schulter. Rechts Skoliose der Brustwirbelfäule stärker als vor der Mobilisation der Rippen. Links vorn sind die Zwischenrippenräume kaum fühlbar. Brustumfang in Höhe der Mammillen rechts 53,5, links 46,5.

Inspiratorisch hebt sich der Brustkorb als Ganzes, das Abdomen wird abgeflacht. Inspiratorische Einwärtsbewegung des unteren Brustbeinteiles. Inspiratorische Verkleinerung des Brustumfanges in Ansatzhöhe des Proc. xiphoideus.

Respirationen sehr frequent und angestrengt mit Anspannung der auxiliären Atemmuskeln. Orthopnoe.

Lungengrenzen: Rechts vorn oberer Rand der 5. Rippe, rechts hinten unten 9. Dornfortsatz, links hinten unten 10. Dornfortsatz, links vorn 4. Rippe, rechts seitlich 3 Querfinger unterhalb der Axilla, links seitlich 5. Rippe; nirgends respiratorische Verschieblichkeit.

Rechts und links lauter Lungenschall mit tympanitischem Beiklang, geht nach abwärts in Dämpfung über; rechts vorn im 4. Intercoostalraum, links vorn von der 3. Rippe ab. Rechts hinten unten vom unteren Rand der Scapula an, links hinten unten 2 Querfinger oberhalb der absoluten Dämpfung.

Das Atemgeräusch ist bds. nach hinten abwärts abgeschwächt; Kompressionsatmen, rechts höher be-

ginnend als links. Rechts mit feinem Krepitieren und und vereinzelt Rhonchi.

Herz: In der Regio cordis hufeisenförmige Narbe, neben dem Sternum noch frische Granulationen. Links parasternal ausgedehnte Pulsationen, vom 1. Intercoostalraum beginnend bis zum 5. Intercoostalraum, der 2-3-4 Intercoostalraum zu einem handtellergroßen pulsierenden Weichteilfenster umgewandelt, an dessen lateralem Rand die Rippenstümpfe zu tasten sind.

Durch den knochenfreien Lappen hindurch, der auf Druck samt seinem Rand stark schmerzempfindlich ist, leistet das Herz dem palpierenden Finger kräftigen Widerstand. Systolisch wölbt sich die Herzdecke ein und liegt dann unter dem Niveau der Umgebung, gleichzeitig verspürt man einen leichten Schlag durch die Verhärtung des Organs. Diastolisch wird das Herz aus dem Fenster herausgebuckelt und fühlt sich weich an.

Nicht alle Partien arbeiten synchron. Die Herzaktion machte den Eindruck des Schaukelns, indem ein kleiner Bezirk direkt neben dem Sternum stets im Zeitmaß vorausging, oder sich in entgegengesetzter Phase befand. In der linken Hälfte des Fensters nahm die Bewegung am lateralen Rand ihren Ausgang.

Die reftierende knöcherne Brustwand hatte an der Bewegung keinen Anteil. Außerhalb der knochenfreien Partie wurde im linken 5. Intercoostalraum etwas außerhalb der Mammillarlinie eine Aktion des Herzens wahrgenommen, die als Spitzenstoß angesprochen wurde. Besonders deutlich, während des Inspiriums, fühlte man hier ein systolisches mit dem Karotispuls koinzidierendes Anschlagen.

Herzgrenzen: Das Gefäßband ist nach links ge-

rückt; im 2. Intercostalraum 4 cm seitlich vom Sternalrand. Die absolute Dämpfung verläuft oben vom 3. Intercostalraum an flach nach außen und läßt sich seitlich von der Lungendämpfung nicht trennen. Rechts entspricht die Grenze dem rechten Sternalrand. Der Spitzenstoß liegt 15 cm seitlich von der Mittellinie. Keine respiratorische oder lokomotorische Verschiebung der Herzgrenzen.

Auskultation: An der Spitze leise klappende Töne. An der Basis paukend, zweiter Ton über der Pulmonalis betont. Nirgends Geräusche. Kein Exsist. Pulsfrequenz 84, regelmäßig, äqualis. Kein Pulsus paradoxus. Blutdruck. (v. Recklinghausen) R=L: 150/110. Hämoglobingehalt nach Sahli 90-95%.

Abdomen: stark aufgetrieben, seitlich überhängend. Nabel verstrichen. Bauchdecken stark gespannt. Fluktuation. Flüssigkeitspiegel 3 Querfinger oberhalb des Nabels. Umfang 95 cm. Leberdämpfung geht seitlich in ascitische über, vorn über dem rechten Rippenbogen Tympanie, wahrscheinlich Kantenstellung. Milz perkussorisch nicht abgrenzbar, später vor dem Rippenbogen palpabel. Kein Oedem der unteren Extremitäten. Der Urin ist dunkel, getrübt, von geringer Menge.

Eine Röntgenaufnahme der Brustorgane zeigt folgende Verhältnisse: Das Zwerchfell steht rechts hoch und ist wenig beweglich. Die Thoraxbegrenzung ist auf beiden Seiten in den unteren Partien stark ausladend. Vom Herzschatten ist rechts nur sehr wenig zu sehen; ein kleiner Schatten unmittelbar über dem Zwerchfell, der mit diesem etwa einen rechten Winkel bildet. Das Herz erscheint im ganzen nach links verlagert. Der Herzschatten ist nach links unten verbreit-

tert und ausgezogen, aber nicht mehr so ausgesprochen wie früher. Es sind die den einzelnen Herzteilen entsprechenden Bogenlinien eben erkennbar, während die Begrenzung früher von Aortenbogen in fast gerader Linie bis zur Spitze hin verlief. Bei der Durchleuchtung zeigt die Herzspitze eine deutlichere Pulfation gegenüber dem ersten Befund.

Neuaufnahme. Der Verlauf gestaltete sich folgendermaßen:

Der Patient erhält 2 Mal täglich 0,25 Theocin. Die Diurese wurde darauf außerordentlich reichlich, 3500 ccm, dann dauernd 2000 ccm. Der Urin war klar, hellgelb, sauer, spezifisches Gewicht 1026, Eiweiß 0,2%, Eßbach, Urobilin vorhanden. Im Sediment spärliche Mengen von Leucocyten, Erythrocyten und Epithelien, Cylinder nicht mit Sicherheit nachweisbar.

Tuberculinreaktion nach Pirquet negativ. Die Dyspnoe ist andertags nicht mehr vorhanden. Die Atmung ist frequent, aber ohne ersichtliche Anstrengung. Die Cyanose verschwand ebenfalls. Der Ascites verkleinerte sich während der 8tägigen Beobachtung auf 88 cm, die Grenze stand 2 Querfinger unter dem Nabel. Probepunktion der Ascites wird abgelehnt. Die Leber gab vom 5. Intercostalraum an abwärts einen schmalen 2 cm breiten Dämpfungstreifen; in der mittleren Axillarlinie stand die obere Grenze an der 6. Rippe, die untere überragte gerade den Rippenbogen.

Auch bei Aufsein tagsüber und Herumgehen verspürte der Patient keine Beeinträchtigung seines Wohlbefindens.

15. III. 11. Patient wird mit entsprechenden Verhaltensmaßregeln nach Hause entlassen.

Wenn wir den Zustand nach der Kardiolyse würdigen wollen, so ist zunächst abzusehen vom Befund der Cyanose und Dyspnoe bei der Nachuntersuchung als accidentell durch die Anstrengungen der Reise bedingt, wie sie ja auch bei geeignetem Verhalten alsbald verschwanden. Ferner ist auf das unzweckmäßige Verhalten des Patienten Rücksicht zu nehmen, der 2 Monate nach dem von ihm kaum überwundenen Eingriff sich keine genügende Schonung gönnte, sondern wieder zu arbeiten versuchte. Trotzdem ist im Vergleich mit dem desolaten Zustand vor der Operation eine wesentliche Besserung unverkennbar:

1. Im subjektiven Befinden, denn der Patient fühlt sich wohl, ist nicht mehr der Spitalpflege bedürftig und kann wieder leichtere Arbeit verrichten.

2. In der Herztätigkeit, es besteht wieder ein positiver Spitzenstoß; der Puls ist voll und gut gespannt, durchaus regelmäßig und gleichmäßig.

3. Die Stauungserrscheinungen sind in der Peripherie vollständig geschwunden. Keine Stauungsbronchitis mehr. Die Stauung vom rechten Herzen ist gebessert.

4. Die Atmung an sich ist erleichtert. Allerdings Frequenzsteigerung durch enormen Zwerchfellhochstand und Lungenkompression. Entsprechend der Natur des Leidens konnte natürlich die Kardiolyse keine Heilung im strengsten Sinne des Wortes zur Folge haben. Sicherlich besteht noch ein Teil der Symptome vor der Operation. Dieselben sind aber mehr lokaler Natur und konzentrieren sich um die Zirkulationsstörung in der Leber. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß hier stationäre anatomische Veränderungen vorliegen, die

kaum einer Rückbildung fähig sind. - Perikarditische Pseudo= (Stauungs=) Lebercirrhose. -

Das Krankheitsbild wird kompliziert durch die Folgeerscheinungen der Leberschwellung mit mächtigen Ascites. Das Zwerchfell ist stark in die Höhe getrieben und komprimiert große Bezirke der Lunge. Außerdem ist auch die Stauungsniere durch den Druck des Ascites zwangslos zu erklären.


- Jedenfalls aber ist eine, wenn auch geringe Entlastung des venösen Systems eingetreten. Daraus läßt schließen die sicher spärlichere Füllung der Halsvenen, die bei graphischer Registrierung nunmehr einen schwachen diastolischen und mäßigen inspiratorischen Kollaps ergeben, sowie das Fehlen von anderen als lokalen Stauungen im Bereich der Vena cava inf. Zudem scheint Leber- und Milzschwellung ein wenig nachgelassen zu haben.

Als Ursache dieser Zirkulationsförderung ist unbedingt die von Brauer postulierte Erlösung des Herzens von der unnützen Mehrarbeit auszusprechen. Der weiche Lappen ist leicht zu bewegen. Es ist klar, daß er allen Gestaltsveränderungen des Herzens folgt und nach wie vor mit jeder Systole eingezogen wird, da ja keine Lösung der Verwachsungen vorgenommen wurde.

Es ist anzunehmen, daß der Fortfall der permanenten Behinderung der Herzarbeit sich vorwiegend im rechten Herzen, das ja direkt der starren Brustwand adhaerent war, geltend macht. Vielleicht wäre mit der besseren Entleerungsmöglichkeit des rechten Ventrikels auch die Dilatation einer Rückbildung fähig und unsere isoliert stehende Beobachtung eines wieder positiv gewordenen Spitzenstoßes, für die noch keine Er-


klärung gegeben ist, wäre der Ausdruck dafür, daß der rechte Ventrikel sich von der Spitze des Herzens zurückgezogen hat und der Spitze des linken Ventrikels wieder Raum gibt, ihren typischen systolischen Anschlag an die Brustwand zu vollführen.

Der positive Spitzenstoß konnte vom tastenden Finger nur ungenügend fixiert werden. Mittels der graphischen Methode gelang es jedoch einwandfrei, die zeitlichen Beziehungen dieses positiven Phänomens festzulegen. Ein großer Trichter wurde in der Gegend des 4. Intercostralum parastral aufgesetzt, ein kleiner Trichter auf den engen 5. Zwischenrippenraum außerhalb der Mammillarlinie.



(Fig. 4). Zeit-schreibung: $\frac{1}{5}$ Sek.
oben: Herz im 4. Intercostralum parastral.
mitte: Iktus im 5.-6. Intercostralum außerhalb
der Mammillarlinie.
unten: Radialis.

(8. III. 11)



(Fig. 5).

Zeitschreibung: $\frac{1}{5}$ Sek.

oben: Kardiogramm im 4. Intercoostalraum parasternal.

mitte: Kardiogramm im 5. Intercoostalraum außerhalb der Mamillarlinie.

unten: Radialis.

(9. III. 11).

Die mit dem Jacquet'schen Sphygmographen geschriebenen Kurven lehren folgendes:

Der Weichteillappen führt im wesentlichen dieselben Bewegungen aus, wie vor der Cardiolyse die ganze Herzdecke. Wenn wir die kleine Zacke, welche den systolischen Abfall einleitet, mit Mackenzie für den Herzstoß, d. h. die Erschütterung durch Übergang der Ventrikel in Kontraktion halten, so zeigt sich deutlich, daß mit der Wiedererreichung dieser Höhe die

Vorwärtsbewegung des Herzens noch nicht beendet ist, sondern in der Diastole noch weiter vorgebuckelt wird.

Die Kurve des Iktus cordis zeigt in allen Phasen ein dazu gegensätzliches Verhalten, der Einlenkung oben entspricht ein mehr oder weniger steiler Anstieg, dessen Fußpunkt der Pulswelle in der Radialis um $^{10}_{20}$ Sek. vorausgeht und somit systolisch sein muß. Die Vorschleudering der parasternalen Gegend entspricht ein Zurücksinken der Herzspitze.

Da wir mit unserer Beobachtung ganz isoliert stehen und in der Cardiolysenliteratur keine ähnliche Erscheinung mitgeteilt ist, möchte ich nicht zu entscheiden wagen, ob wir wirklich hier einen typischen Spitzenstoß vor uns haben. Es wäre denkbar, daß Schwarten, welche diese betreffende Stelle an der Unterfläche der Brustwand mit der Vorderfläche des Herzens verbinden, als Überträger von Kräften wirkten, so daß beim Vorschleudern des Herzens durch das Fenster die Schwarten angespannt würden und ihrerseits den 5. Intercoostalraum nach einwärts zerrten. Außerdem könnte man ja auch bei der lokalen Ausschaltung der Lungenelastizität eine Wirkung des atmosphärischen Außendruckes annehmen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Erfolg größer hätte sein können, wenn sich der Patient nicht 2 Jahre der klinischen Beobachtung entzogen hätte und erst mit irreparablen Veränderungen wieder kam. Es ergibt sich die Forderung, so früh als möglich zu operieren. Für den Patienten wird es jetzt notwendig sein, ein bescheidenes Maß von körperlicher Tätigkeit zu finden, wodurch das Herz keine allzu große Belastung erfährt.

Fall II.

Concretio cordis, nicht operirt.

August N., 36 Jahre alter Fuhrmann aus Haslach i. K.

Aufnahme in der Freiburger medizinischen Klinik
am 18. VI. 10.

Anamnese: Patient stammt aus gesunder Familie, Eltern leben noch und sind gesund, ebenso alle Geschwister. Derselbe will nie krank gewesen sein. Vor drei Wochen stellten sich bei ihm die ersten Vorboten seines jetzigen Leidens ein und zwar verspürte er damals, als er eine Strecke seinem Wagen nachlaufen mußte, Herzklopfen und Engigkeit auf der Brust. Zur selben Zeit litt Patient an Verstopfung. Die Beschwerden steigerten derart, daß ihn der Arzt in die Klinik verwies.

Die subjektiven Beschwerden des Patienten bestehen jetzt in Engigkeitsgefühl auf der Brust und Atemnot, zu denen sich noch, sobald der Patient sich ein wenig anstrengt, Herzklopfen zugesellt.

Befund: Kräftig gebauter, gut ernährter Mann mit wohl entwickelter Muskulatur und mäßigem Fettpolster. Hals- und Rachenorgane ohne Besonderheiten.

Thorax breit, gut gewölbt. Brustumfang bei mittlerer Atmung rechts 53,5 cm, links 55 cm.

Lungengrenzen: Rechts vorn am unteren Rand der 6. Rippe, rechts hinten unten in der Höhe des 11. Brustwirbels, beide respiratorisch gut verschieblich. Linke hintere Lungengrenze 2 Finger breit höher, respiratorisch nicht verschieblich.

In der linken Infraclaviculargrube bis zum oberen Rand der 2. Rippe Schall etwas verkürzt; Expirium verschärft; über der linken Spitze feines Knistern.

Atemgeräusch von der 2. Rippe an abwärts nicht mehr hörbar, ebenso in der linken Axillargegend bis zur hinteren Axillarlinie. Über der rechten Lunge überall vesiculäres Atem.

Herz: Absolute Dämpfung oben am oberen Rand der 3. Rippe, rechts Mitte des Sternums; linke Grenze 1 Finger breit außerhalb der Mammillarlinie.

Relative Dämpfung: obere horizontale Grenze an der 2. Rippe, rechte Grenze: rechter Sternalrand; die linke Grenze geht in die absolute über. Spitzenstoß im 5. Intercostalraum 1 cm außerhalb der Mammillarlinie, schwach fühlbar.

An der Spitze ist nur ein erster Ton dumpf und leise zu hören. Ebenso über Pulmonalis und Aorta nur der zweite Ton zu hören. Am Ansatz der 5. Rippe am Sternum links extrapericardiales Reiben.

Abdominalorgane ohne Besonderheiten. Reflexe normal.

Urin: sehr viel Ziegelmehlsediment, spezifisches Gewicht 1018. Eiweiß und Zucker fehlen. Menge 500 ccm. Puls frequent, celer, inæqual, leicht unterdrückbar. Temperatur erreicht dauernd abends 38° C.

Röntgenbefund vom 20. VI. 10.:

Der Herzschatten ist ganz enorm vergrößert, besonders nach links, wo er ganz nahe bis an die Thoraxbegrenzung hinreicht. Er zeigt beiderseits von der Herzbasis zwerchfellwärts stark bogenförmig verlaufende Begrenzungslinien. Von den normaliter vorhandenen Einkerbungen ist nichts mehr sichtbar. Zwischen der linken Begrenzung des Herzschattens und der Thoraxwand ist nur mehr ein ganz schmales Lungenfeld sichtbar, das intensiv getrübt erscheint. Auch die Teile der Lungenfelder, die dem Herzschatten links aufliegen,

zeigen starke Trübung. Das Zwerchfell ist nicht erkennbar. Der Herzschatten zeigt nur in den basalen Partien pulsatorische Bewegung, während die dem Zwerchfell benachbarten Teile still zu stehen scheinen.

Diagnose: Pericarditis exsudativa.

Therapie: Eisblase, Digitalen und Morphinum. Bettruhe.

20. VI. 10. Morgens um 10h wird eine Probepunktion gemacht, bei der sich ein sehr stark sanguinolentes, fast nur aus Blutkörperchen bestehendes Exsudat zeigt. Eine zweite 6h p. m. vorgenommene Probepunktion ergibt dasselbe Resultat. Der Nachweis von Tuberkelbazillen gelingt in 5 Präparaten.

22. VI. 10. Punktion des Herzbeutels, bei der sich 350 ccm Flüssigkeit von der obengenannten Beschaffenheit entleeren. Harnmenge steigt auf 2200 ccm p. d.

26. V. Während die obere Grenze des Pericardialexfudats gefallen ist, manifestiert sich links ein Pleuraexfudat. Links hinten bis zur Höhe des 4. Brustwirbels absolute Dämpfung, die sich nach abwärts erstreckt und seitlich in die absolute Herzdämpfung übergeht. Atemgeräusch und Pektoralfremitus hier abgeschwächt.

Vom 16. VII. an Ordination von Inf. Digitalis und Diuretin, worauf die Diurese zeitweise auf 3000 steigt.

20. VII. Das Pleuraexfudat ist um 3 Querfinger gesunken. Ordinatio nihil, kann aufstehen.

3. VIII. Auf Wunsch gebessert entlassen.

Patient stellt sich zur Nachuntersuchung wieder vor am 29. 11. 10. Derselbe ist stark kurzatmig, geht aber zu Fuß ganz gut. Lungen: nirgends Dämpfung, über

dem linken Unterlappen kleinblasiges Rasseln, über dem rechten Unterlappen feines Knistern.

Herz: Keine wesentliche Hypertrophie. Leichtes systolisches Geräusch an der Spitze. Zweiter Pulmonalton accentuiert.

Abdomen: Leber ist stark vergrößert und derb. Sie reicht mit ihrem unteren Rande bis an den Nabel herab.

Im Urin befinden sich Spuren Albumen, keine Cylinder.

Diagnose: Insufficiencia cordis, bedingt durch Pericardobliteration.

Bericht an den Hausarzt: chronische Digipuratbehandlung.

10. III. 11. Auf briefliche Anfrage antwortete Patient, daß es ihm sehr schlecht gehe, er sei bettlägerig und leide unter heftigen Atembeschwerden und starker Schwellung der Beine.

11. IV. 11. Nachuntersuchung in H. Ich erfahre vom behandelnden Arzt, daß die vorher bestandenen Beschwerden nach Digipurat-Ordination nachgelassen haben, ebenso wurde die Urinmenge reichlicher. Fieber war nicht vorhanden. Zeitweise war extrapericardiales Reiben zu hören.

Patient steht jetzt untertags auf und kann leichtere Hausarbeit verrichten. Er klagt über Kurzatmigkeit, die bei körperlicher Bewegung unerträglich zunimmt. Appetit zufriedenstellend. Zeitweise Husten und Auswurf dünnen weißlichen Sputum.

Befund: Sehr guter Ernährungszustand, reichlicher Panniculus adiposus. Gesicht gedunsen und cyanotisch, Cyanose der Lippen und Schleimhäute, Extremitäten kühl und cyanotisch. Starkes Oedem der Unter- und

Oberschenkel, geringes Sakraloedem. Die Venen des Halses sind mäßig prominent, zeigen keine deutliche Pulsation. Die mit dem Jacquet'schen Sphygmographen geschriebenen Venenkurven ergeben geringen diastolischen und mäßigen inspiratorischen Kollaps.

Puls 80, klein, schlecht gefüllt, regelmäßig; in den Kurven Pulsus paradoxus geringen Grades, vereinzelte Extrasystolen. Die größte Pulswelle ist die erste im Expirium.

Lungengrenzen: Rechts vorn 5. Intercoostalraum rechts hinten unten 10 Dornfortsatz gut verschieblich. Links hinten unten 11 Dornfortsatz unverschieblich. Über der linken Spitze steht die obere Grenze am vorderen Rande des Trapezius 2 Finger breit tiefer als rechts. Lungenschall hinten beiderseits nach abwärts tympanitisch. Hinten unten beiderseits rechts höher als links Dämpfung, rechts vorn schmaler Dämpfungstreifen. In der rechten Axilla absolute Dämpfung, in der linken starke Tympanie. Über der linken Spitze Schallverkürzung. Atemgeräusch beiderseits hinten unten abgeschwächt mit vereinzelten Rassengeräuschen, rechts mehr als links. Über der linken Spitze Expirium verlängert und verschärft. Diffuse Rhonchi.

Brustumfang: rechts 50 cm, links 52 cm bei mittlerer Atmung. Keine inspiratorische Einziehung des Sternum. Atmung costo=abdominal ohne ersichtliche Anstrengung. Rippenbogen wird gut gehoben. Epigastrium inspiratorisch vorgewölbt.

Herz: In der Regio cordis keine sichtbare Herzaktion oder Pulsation. Spitzenstoß weder sichtbar noch fühlbar. Relative Herzdämpfung oben 3. Rippe, rechts 1 cm rechts vom rechten Sternalrand, links

außerhalb der Mammilla = 12,5 cm. Die absolute Dämpfung markstückgroß am linken Sternalrand. Die Spitze nach links ausgezogen, geht in Lungendämpfung über.

An der Spitze beide Töne leise, kaum hörbar, an der Basis nur ein zweiter Ton zu hören, über der Pulmonalis klappend. Mitten über dem Herzen und nach der Spitze zu präysistolisch=diastolisches „Lederknarren“, das im Expirium erheblich stärker wird.

Abdomen: In den abhängigen Partien keine Dämpfung. Leber: obere Grenze der relativen Leberdämpfung an der 4. Rippe, absolute im 5. Intercostralum, reicht nach unten bis 2 Querfinger unterhalb Nabelhöhe, schneidet den linken Rippenbogen in Mammillarlinie. Konsistenz derb grobhöckerig, nicht schmerzhaft. Die Pulsation ist andeutungsweise zu fühlen. Die Kurven des Leberpulses zeigen denselben Charakter als wie die Inguinalvenen. Milz handbreit vor dem Rippenbogen inspiratorisch zu palpieren. Sonst keine abnormen Resistenzen. Urin braunrot, trübe durch reichliches Sedimentum lateritium, reagiert stark sauer, Eiweiß 0,5 ‰ Eßbach, Urobilin vorhanden.

Im Zentrifugat massenhaft Konkreme von harnsaurem Natron, zellige Elemente: spärliche Leukocyten. Cylinder mit Sicherheit nicht nachweisbar.

Wir haben es somit mit einem bis dahin gefunden 35jährigen Mann zu tun, der plötzlich anscheinend im Anschluß an eine Körperanstrengung unter dem Bild einer akuten exsudativen Pericarditis erkrankt. Nach Ablassung des Exsudats gesellt sich eine linksseitige Pleuritis hinzu. Beide Ergüsse bilden sich innerhalb 6 Wochen im wesentlichen zurück, so daß der Patient

gebessert aus der klinischen Behandlung entlassen werden konnte.

Während der Patient zunächst wieder arbeitsfähig war, traten nach einem Vierteljahr Insuffizienzerscheinungen auf, Stauungsniere, sowie starke Vergrößerung und Induration der Leber. Nach kurzen durch cardio-tonische Nachhilfe erreichten Besserungen verschlimmert sich das Leiden zusehends, so daß schließlich infolge zunehmender Dekompensation und sich stets wieder-einstellender Oedemen der Patient dauernd der Bett-ruhe bedürftig ist.

Im April 1911 findet man 1. am Herzen breite pyramidenförmige Dämpfungsfigur, von kompensatorisch dilatierte Lunge zum größten Teil überdeckt. Deshalb keine sichtbare Aktion, sehr leise Töne. Von der Atmung abhängiges Reiben. Halsvenen leicht gestaut ohne deutliche Pulsation. Pulsus paradoxus vom dynamischen Typus.

2. Im linken Brustraum pleuritische Exsudatreste, welche Herz mit Lunge verbinden. Stauungsbronchitis.

3. Im Bauchraum stark vergrößerte Stauungsleber mit geringer Pulsation, Stauungsmilz, kein Ascites. Stauungsniere. Hydrops anasarca der unteren Körperhälfte.

Aetiologie. Wenngleich schon durch eine manifeste *Affectio apicis pulmonis sinistri* der ätiologischen Ergründung des Falles Anhaltspunkte in bestimmter Richtung gegeben wurden, so war doch ausschlaggebend der bakterielle Befund bei der Probepunktion. Es ist bemerkenswert, daß es ohne Zentrifugieren gelang, in mehreren Ausstrichpräparaten Tuberkelbazillen zu finden. Charakteristisch war ferner das zu Tage geförderte Punktat, in dem massenhaft Erythrocyten vor-

handen waren mit nur geringer Beimengung von Fibrinflocken. Die sanguinolente Beschaffenheit war so vorherrschend, daß man im ersten Augenblick während der Punktion die Befürchtung hegte, ein Blutgefäß oder gar den Ventrikel mit der Punktionsnadel getroffen zu haben.

Bei der Frage der Pathogenese können wir unter Zuhilfenahme der Erfahrungen, über welche Sinnhuber berichtet, kaum an ein direktes Verschleppen der Bazillen von der Spitzentuberkulose aus denken. Sinnhuber gibt als den weitaus häufigsten Ausgangspunkt der tuberkulösen Pericarditiden verkäste Drüsen an der Herzbasis an. Die Annahme eines Durchbruchs solcher verkästen Drüsen wäre imstande, neben der Ausaat massenhafter Tuberkelbazillen auch die abundante Hæmorrhagie zu erklären.

Der klinische Verlauf des Falles ist sicher kein allzu häufiger. Sinnhuber scheidet neben der symptomatischen Pericarditis bei allgemeiner Tuberkulose folgende Formen von einander. 1. die latente, 2. von vornherein zu Adhäsionen führende chronische Entzündung, 3. die akute Entzündung mit mehr oder weniger Exsudat. Letzterer Gruppe, der unser Fall zugehört, stellt Sinnhuber eine besonders ungünstige Prognose. Das Exsudat soll jeder Behandlung trotzen, einer Punktion baldige Erneuerung folgen. Die behinderte Herzkontraktion läßt die Exsudate sich rasch vergrößern und diese beschleunigen ihrerseits das Eintreten der Herzinsuffizienz.

Es ist hier also ein seltener Erfolg zu verzeichnen, daß nach der Punktion, die aus der „Indicato vitalis“ heraus gemacht wurde, eine so günstige Wendung eintrat. Die vorher ganz ungenügende Herztätigkeit, die

auch durch Digalen nicht sonderlich zu beeinflussen war, besserte sich zusehends. Eine Pleuritis mit großem Exsudat wurde gut überwunden. Die Ansammlung eines neuen pericardialen Exsudats blieb nicht nur aus, sondern auch der Rest bildete sich zurück.

Von einer Heilung im eigentlichen Sinne wird natürlich nicht die Rede sein können. Höchstwahrscheinlich ist anzunehmen, daß das zurückgebliebene fibrinös-hämorrhagische Exsudat in Organisation überging, wie ja bekanntlich derart charakterisierte Exsudate am meisten zu Schwartenbildung prädisponieren. Die typischen abdominellen Stauungssymptome neben anfangs gleichzeitigem Fehlen von peripheren Zirkulationsstörungen weisen mit größter Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß sich hier eine Obliteratio Pericardii etabliert hat. Wir befinden uns damit in Einklang mit der bekannten Tatsache, die Sinnhuber besonders hervorhebt, daß leider allzu oft gerade bei tuberkulösen Pericarditen Herzsymptome vollständig fehlen und das Dominieren der abdominellen Affektion zur Diagnose „Cirrhose“ verleitet.

Zur Erklärung des Dominierens des abdominellen Symptomenkomplexes werden wir auf die schon beim ersten Fall angeführten Befund von Heß zurückgreifen müssen, nämlich Verengung der unteren Hohlvene durch Narbenbildung im Herzbeutel.

Weil hier nun auch die Diagnose Concretio cordis gestellt wurde, könnte man versucht sein, als Therapie gleichfalls die Cardiolyse vorzuschlagen. In der Tat meint auch Danielsen, Fälle, die ohne Einziehung am Thorax verlaufen, wären dann für die operative Behandlung geeignet, wenn infolge der Störung der Herztätigkeit gröbere Zirkulationsstörungen, vor allem

Stauungslebercirrhose entstehen. In solcher weitherziger Fassung können wir diesem Vorschlag nicht beipflichten. Wenn wir das Ziel der Brauer'schen Operation in einer „Entlastung des Herzens von unnützer Mehrarbeit“ erblicken, so ist evident, daß hier, wo das Herz den knöchernen Thorax nicht mitbewegt und auch gar nicht mitbewegen kann, weil lufthaltiges, elastisches Lungengewebe dazwischen geschaltet ist, durch eine osteoplastische Resektion der vorderen Brustwand für die Herztätigkeit keine andere Bedingungen geschaffen werden.

Ziehen wir zum Vergleich diejenigen erfolgreich operierten Fälle heran, die ohne breite systolische Einziehung verliefen - hierher gehören 2 der Patienten v. Beck's - so resultierte bei denselben die Behinderung der Herztätigkeit aus den Schwarten der Pleura peri=etpräcardiaca, verbunden mit Atelektase der angrenzenden bezw. vorgelagerten Lungenpartie. Die Cardiolyse änderte am Zustand der Schwarten nichts; aber die Bedingungen, unter denen das Herz nunmehr arbeitete, waren insofern der Norm genähert, als an Stelle des atmenden Lungengewebes jetzt durch das Thoraxfenster hindurch die atmosphärische Außenluft wenigstens in einer Richtung Aktionsfreiheit garantierte.

Wenn wir von solchem Gesichtspunkt aus die Cardiolyse betrachten, so ist derselben in nahe Analogie zu setzen ein Verfahren, das Wenckebach zur Behandlung der exsudativen Pericarditis in allerletzter Zeit vorgeschlagen und selbst an einem Fall mit günstigem Erfolg erprobt hat: Wie es seit langem schon bei Pleuritis geschehe, soll nach Entleerung der Flüssigkeit sterile Luft in die Pericardhöhle eingelassen wer=

den. Wenckebach sieht in dieser Methode neben einer vielleicht günstigen Beeinflussung der tuberkulösen Entzündung selbst vornehmlich folgende Vorteile:

1. Entlastung des Herzens durch Wegnahme der schweren Flüssigkeit und Ersatz durch Luft.

2. Es wird vielleicht in dieser Weise möglich sein, die so gefürchtete Concretio pericardii zu verhindern. Leider war das Verfahren zur Zeit als im Fall II die Paracentese des Herzbeutels ausgeführt werden mußte, weiteren Kreisen noch nicht bekannt, so daß es nicht in Erwägung gezogen werden konnte.

Es ist klar, daß später, wenn es bei dem jetzt noch in Entwicklung begriffenen Fall vielleicht zu Adhäsionen an der Brustwand kommen sollte, wir dann die Cardiolyse für indiciert halten würden.

Zusammenfassend kommen wir aufgrund unserer Fälle zu folgendem Ergebnis: Die Diagnose der Concretio cordis ist, falls die Anamnese Anhaltspunkte für eine vorausgegangene Pericarditis bietet und der lokale Befund am Herzen damit in Einklang steht, aus den geschilderten pathognomonischen Zeichen mit großer Wahrscheinlichkeit zu stellen. Dabei ist die mechanische Behinderung der Herztätigkeit, insbesondere die systolische Einziehung und diastolisches Thoraxschleudern, als ein sehr wesentliches diagnostisches Moment zu erachten. Fehlen dieses Symptomes spricht, in Berücksichtigung der vielfachen individuellen Lokalisationsmöglichkeiten von Adhäsionen, nicht gegen die Diagnose, wenn von Fall zu Fall Gründe gefunden werden, welche die fehlende Mitbewegung des Thorax erklärlich machen.

Die Cardiolyse ist die gegebene Therapie für alle diejenigen Fälle von Concretio cordis, wo durch Mit-

bewegung des Thorax eine nachweisbare mechanische Behinderung der Herztätigkeit stattfindet. Nach dem Erfolge bei einem Kranken dieser Art können wir der Cardiolyse eine geradezu lebensrettende Bedeutung zusprechen. Es empfiehlt sich, bevor man zur Operation schreitet, sich über die funktionelle Tätigkeit des Herzens Gewißheit zu verschaffen, indem man den Versuch einer leidlichen Kompensation der Herzkraft wenigstens für den Zustand der Bettruhe macht. Eine Kompensierung auch gegenüber der Mehrleistung, welche das Stehen und Umhergehen bei außer Bett befindlichen Patienten erfordert, wird meist nicht mehr zu erreichen sein.

Eine bereits ausgebildete Stauungscirrhose soll keine Kontraindikation zum chirurgischen Eingriff abgeben, da bei einem noch leistungsfähigen Herzen mit größter Sicherheit auf Rückbildung der nicht lokal bedingten Stauungen gerechnet werden kann und Aussicht auf Nachlassen der Zirkulationsstörungen in der Leber besteht.

Es wurde drei Monate nach der Cardiolyse bei einem Patienten an der Herzspitze ein positives systolisches Phänomen beobachtet, dessen Genese nicht mit aboluter Sicherheit eruiert werden konnte. Es wird empfohlen, auf sein Vorkommen bei weiteren Fällen zu achten.

Literatur.

1. v. Beck. Zur Cardiolyse bei chronischer adhäsiver Mediastino-pericarditis postpleuritica. Langenbecks Archiv, 1904 Bd. 13.
2. Bewley. A clinical lecture on cardiolyse. Brit. med. Journ., 1910.
3. Brauer. Indicationen zur Cardiolyse. Langenbecks Archiv, 1903, Bd. 11, Zentralblatt für Chir., 1903.
4. Brauer. Untersuchungen am Herzen. Verh. d. XXI. Kongr. J. M., 1904.
5. de la Camp. Physik und innere Medizin. Vortrag Freiburg, 1911.
6. Danielsen. Ueber chron. adhäsive Mediastino-Pericarditis. Beitr. z. Klin. Chir., 1906, Bd. 51.
7. Delorme. Sur un traitement chirurgical de la symphyse cardio péricardique. Gaz. des hôpitaux, 1898.
8. Friedreich. Krankheiten des Herzens. Hdb. d. Spez. Path. u. Ther., 1867.
9. O. Hess. Ueber Stauung und chron. Entzündung in der Leber und den serösen Höhlen. Habilitationsschrift, Marburg 1902.
10. F. A. Hoffmann. Funktionelle Diagnostik und Therapie der Herzkrankheiten, 1911.
11. Holzknecht und Hofbauer. Zur Physiologie und Pathologie der Atmung. Mitt. aus dem Laborat. f. radiol. Diagn. und Ther., 1907.
12. Krehl. Krankheiten der Kreislauforgane, 1909.
13. Kussmaul. Mediastino-Pericarditis. Berl. klin. W., 1873.
14. Lehmann und Schmoll. Pericarditis adhäsiva im Röntgenogramm. Fortschr. auf d. Geb. der Röntgenstrahlen, 1905, Bd. IX.
15. J. Mackenzie. Lehre vom Puls, 1904.
16. J. Mackenzie. Lehrbuch der Herzkrankheiten, 1910.

17. Oestreich-de la Camp. Anatomie und physikalische Untersuchungsmethoden. Berlin, 1905.
 18. F. Pick. Ueber chron. unter dem Bild der Lebercirrhose verlaufende Pericarditis.
 19. Riegel. Ueber Verwachsungen des Herzbeutels. Volkmann's Votr. N. F. 177.
 20. Roos. Klinische Untersuchungen über die Schallerscheinungen des Herzens, Leipzig 1911.
 21. Riegel. Ueber pulsus paradoxus. D. M. W., 1903.
 22. Rosenbach. Pericarditis in Eulenburgs Realencyclopädie.
 23. v. Schrötter. Erkrankungen des Herzbeutels in Nothnagels Spez. Path. und Ther.
 24. Sinnhuber. Die Erkrankungen des Herzbeutels, Berlin 1911.
 25. Stuetz. Pericarditis adhäsiva im Röntgenogramm. Fortschr. auf d. Geb. d. Röntgenstrahlen, 1903/04, Band VII.
 26. Treupel. Cardiolyse bei adhäsiver Mediastino-Pericarditis. M. m. W., 1905.
 27. Ueber. Krankheiten des Herzbeutels. Deutsche Klinik, Bd. VI.
 28. Ueber. Mediastino-Pericarditis und Cardiolyse. Ther. der Gegenwart, 1905.
 29. Venus. Die chirurgische Behandlung der Pericarditis und der chronisch-adhäsiven Mediastino-Pericarditis (Cardiolyse). Sammelreferat, Mitt. aus dem Grenzgeb. der Med. u. Chir., 1903.
 30. Weichselbaum. Ueber seltene Lokalisationen des pneumonischen Virus. Wiener klin. W., 1888.
 31. Wenckebach. Ueber pathol. Beziehungen zw. Atmung und Kreislauf. Volckmann's Votr. 465/66. 1907.
 32. Wenckebach. Some points in the path. and treatment of adherens pericardion. Brit. med. Journ., 1907.
 33. Wenckebach. Beobachtungen bei exsudativer und adhäsiver Pericarditis. Ztschr. f. klin. Med., 1910, Bd. 71.
-

An dieser Stelle sei es mir gestattet, Herrn Prof. Dr. de la Camp für die Überweisung der Arbeit und gütige Übernahme des Referates meinen ergebensten Dank auszusprechen. Auch bin ich Herrn Dr. Stuber für die freundliche Durchsicht der Arbeit sehr zu Dank verpflichtet.

Lebenslauf.

Geboren wurde ich, Georg, Friedrich, Wilhelm, Bernhard Hagen am 8. Mai 1888 zu Berlin als Sohn des Kaufmanns C. Bernhard Hagen und seiner Gemahlin Eugenie Hagen, geb. Kothe.

Ich besuchte die höhere Bürgerschule zu Rotenburg a./Fulda bis Ostern 1903, dann ein Jahr das Gymnasium zu Offenburg. Von Ostern 1904 an war ich auf dem Gymnasium zu Donaueschingen, wo ich die Reifeprüfung am 12. Juli 1906 bestand. Ich studierte Medizin vom W.=S. 1906/07 bis W.=S. 1908/09 in Freiburg i./Br. und legte daselbst die ärztliche Vorprüfung am 9. März 1909 ab. Darauf studierte ich je ein Semester in Kiel, Berlin und München und kehrte im W.=S. 1910/11 wieder nach Freiburg i./Br. zurück, wo ich am 3. Dezember 1911 das medizinische Staatsexamen bestand.

Vom 1. April bis 1. Oktober 1907 diente ich als Einjährig-Freiwilliger im 5. bad. Inf.=Regt. Nr. 113 zu Freiburg i./Br.
